



De goniectomie – bij uveïtis en/of steroidglaucoom

Inleiding


In ieder oog wordt continu vocht geproduceerd, en ook weer afgevoerd. Bij oogontstekingen (uveïtis) functioneert de afvoer soms niet meer goed. De afvoer kan verstopt raken door de ontsteking zelf of door het gebruik van steroid oogdruppels (dexamethason of predforte), waarmee de ontsteking wordt behandeld.

Ook bij andere oogziekten waarvoor steroid oogdruppels worden gebruikt kan de afvoer verstopt raken.

Het gevolg van een verstopte afvoer is een te hoge oogdruk. Een te hoge oogdruk beschadigt op den duur de oogzenuw en dan wordt het oog slechtziend of zelfs blind. Tijdig behandelen kan dat voorkomen.

Een hoge oogdruk wordt meestal behandeld met oogdruppels. Als dat onvoldoende werkt, dan is een operatie nodig, de goniectomie.

Doel van de operatie is om de afvoer weer toegankelijk te maken. Hiertoe wordt de kamerhoek van het oog, waar de afvoer zit, met een klein mesje ingesneden. Dit is getekend in de volgende figuur.



Wat u moet weten

vóór de operatie

Speciale voorbereidingen zijn niet nodig. Tot de operatie gaan alle voorgeschreven medicijnen en oogdruppels gewoon door.

rond de operatie

Volwassenen: De operatie wordt onder lokale verdoving of onder narcose verricht. Dit gebeurt in dagbehandeling, er is dus geen opname in het ziekenhuis nodig.

Kinderen: De operatie wordt onder narcose verricht. Dit gebeurt in dagbehandeling, er is dus geen opname in het ziekenhuis nodig.

Na de operatie zit er een verband voor het geopereerde oog. Bij pijn kan paracetamol gebruikt worden. Het verband mag u tot de volgende ochtend laten zitten.

In het oog kan een luchtbel te zien zijn, en soms wat bloed. Dat is normaal.

na de operatie

De eerste controle vindt plaats de ochtend na de operatie.

De tweede controle vindt plaats een week na de operatie.

Bij volwassenen worden dan de hechtingen verwijderd op de polikliniek.

Bij kinderen worden oplosbare hechtingen gebruikt, deze verdwijnen vanzelf.

Risico's en verwachtingen

Het doel van de operatie is de oogdruk te verlagen en daarmee de oogzenuw te beschermen. Bij ongeveer 70% van de patiënten lukt dat met één operatie. Soms is een tweede operatie nodig (een aanvullende goniectomie). Lukt het daarmee ook niet de oogdruk onder controle te krijgen, dan kan er een kleine drain in het oog geplaatst worden (Baerveldt glaucoom-implantaat). Op deze wijze lukt het vrijwel altijd de oogdruk onder controle te krijgen en het zicht te behouden. Bij kinderen jonger dan 10 jaar kan soms een lui oog ontstaan en daarom worden jonge kinderen niet alleen door de oogarts maar ook door een orthoptiste gecontroleerd.

De goniectomie heeft als operatie zelf relatief weinig risico's.

Een wit plekje op het hoornvlies (ontstoken hechting), een rood oog, pijn, of het niet meer kunnen zien van de pupil wijzen op een mogelijk probleem. Wacht dan niet de volgende controle af maar neem contact op met onze polikliniek. Ook als de polikliniek gesloten is, is er een dienstdoende oogarts bereikbaar.

Zeer zeldzaam (1 op 1000) treedt een infectie binnen in het oog op, wat het verlies van het oog tot gevolg kan hebben.

Wat kunt u verwachten op de afdeling Oogheelkunde als u een oogoperatie krijgt?

In deze film laten wij u de afdeling Oogheelkunde zien. We gaan langs bij de polikliniek en bezoeken onze twee operatielocaties. Zo krijgt u een goed beeld van wat u kunt verwachten als u voor een oogoperatie in aanmerking komt.



Druppelschema na de operatie – voor het geopereerde oog

- Eventuele oogdrukverlagende druppels die voor de operatie gebruikt werden kunnen nu gestaakt!
- Houd 2 minuten tussen de oogdruppels indien er meerdere soorten druppels nodig zijn.
- X = 1 druppel.
- U start met het druppelschema de ochtend NA de operatie.
- Minims (kleine wegwerp ampullen) oogdruppels kunt u 24 uur gebruiken en in een schoon glas in de koelkast bewaren; gewone flesjes zijn een maand houdbaar.

De eerste twee weken na de operatie:

Oogdruppel	Ochtend	Middag	Avond
Dexamethason (of predforte)	X	X	X
Ofloxacine	X	X	X

Daarna nog 4 weken (dus tot 6 weken na de operatie):

Oogdruppel	Ochtend	Middag	Avond
Dexamethason (of predforte)	X		X
Ofloxacine	X		X

De tijden zijn bij benadering: verdeel de druppels over de dag en zoek momenten uit die passen in het dagritme.

Let op: Sommige patiënten met oogontstekingen gebruiken al langer dexamethason of predforte. Tel dan het aantal druppels op bij het schema:

Voorbeeld: worden er voor de operatie 2 druppels dexamethason per dag gebruikt, dan is dat na de operatie dus 5 druppels per dag, en na 2 weken nog 4 druppels per dag. En dan 6 weken na de operatie niet helemaal stoppen, maar terug naar de dosering van voor de operatie, in dit voorbeeld 2 druppels per dag.

Leefregels

Bij jonge kinderen dient het horlogeglasverband in principe tot een week na de operatie gebruikt te worden. Soms geeft het veel irritatie terwijl er geen neiging is om in het oog te wrijven. Dan kunt u het glas achterwege laten, in ieder geval overdag.

Oudere kinderen en volwassenen dragen als bescherming 's nachts een harde dop voor het oog en overdag een bril.

Het gaasje onder de harde dop is alleen de eerste nacht nodig.

Wassen, in bad, etc. is allemaal toegestaan, probeer water in het oog zoveel mogelijk te voorkomen.

Vragen

Eventuele vragen kunt u stellen aan uw oogarts of aan de verpleegkundige. Voor telefoon nummers kijkt u bij 'route en contact' op de website.

Website

Voor meer informatie kunt u kijken op www.oogheelkundeumcg.nl