




Vitrectomie bij Lensresten na een staaroperatie

Wat is er niet goed gegaan en waarom is een tweede operatie nodig?

In een klein aantal gevallen verloopt de staaroperatie niet helemaal naar wens. Een van de complicaties is het achterblijven van lensresten in de glasvochtruimte. Dit leidt tot een ontstekingsreactie in het oog.



doorsnede van een gezond oog

Behandeling

In minder ernstige gevallen kan volstaan worden met oogdruppels. Is de ontstekingsreactie ernstig dan kan de oogdruk oplopen. Dit kan weer leiden tot beschadiging van het hoornvlies en de oogzenuw. Een operatie kan dan noodzakelijk zijn.

Tijdstip van operatie

Meestal hoeft deze operatie niet dezelfde dag te worden uitgevoerd. Vaak is het zelfs beter de operatie enkele dagen uit te stellen tot het oog met oogdruppels wat tot rust is gebracht.

Operatie

De achtergebleven lensresten worden door een vitrectomie (glasvocht operatie) verwijderd.

De operatie wordt in dagbehandeling verricht (u wordt dus niet in het ziekenhuis opgenomen) onder plaatselijke verdoving (meestal) of in narcose (soms).

Kunstlens

Het komt voor dat de oogarts bij de staaroperatie geen kunstlens heeft kunnen plaatsen. Bij de vitrectomie kan dat meestal alsnog gebeuren. Soms kan het nodig zijn het plaatsen van de kunstlens uit te stellen. Dan is op een later tijdstip een derde operatie nodig.

Resultaat

Als het netvlies voor de operatie geen afwijkingen had en zich verder geen complicaties voordoen zal de uiteindelijke gezichtsscherpte heel redelijk en vaak zelfs min of meer normaal worden. Het herstel kost enkele weken tot maanden

Complicaties

Zoals bij iedere operatie is er een kans op complicaties. De kans is echter klein. Zo is er een kans van 1 op 1000 à 2000 operaties op een infectie. Een netvliesloslating kan bij 2% van de operaties optreden. De complicaties zijn vrijwel altijd op te lossen maar zij hebben wel een negatief effect op het herstel van de gezichtsscherpte.

Het hoornvlies kan troebel blijven of worden. In het uiterste geval kan later een hoornvliestransplantatie nodig zijn.

De inhoud van deze folder is ontleend aan de NOG site.

Druppelschema na de operatie – voor het geopereerde oog

- U moet met uw eigen oogdruppels gewoon doorgaan tenzij uw oogarts u andere instructies heeft gegeven.
- Houd 2 minuten tussen de oogdruppels
- X = 1 druppel
- U start met het druppelschema de dag NA de operatie.
- De minims (kleine wegwerp ampullen) oogdruppels kunt u 24 uur gebruiken en in een schoon glas in de koelkast bewaren.

Tot twee weken na de operatie:

Oogdruppel	ontbijt	avondeten	voor het slapen
Dexamethason	X	X	X
Chlooramfenicol	X	X	X
Naclof	X	X	X

Daarna tot de flesjes leeg zijn,

of de houdbaarheidsdatum overschreden is:

Oogdruppel	ontbijt	avondeten	voor het slapen
Dexamethason	X		X
Naclof	X		X

Leefregels

De ochtend na de operatie verwijdert u het kapje (bewaren) en gaasje (weggooien) en begint u met het druppelschema.

Als u voor controle naar de oogarts moet, dan dit ook graag van te voren al doen.

De eerste week draagt u als bescherming 's nachts een harde dop voor het oog en overdag een bril.

Bukken, tillen, sporten, sauna, en make-up dienen de eerste week vermeden te worden, daarna in overleg met uw oogarts.

Vermijd wrijven in het oog!

TV-kijken, lezen, computeren, traplopen, douchen en haarwassen mag wel.

Deelnemen aan het verkeer, is niet toegestaan tot de oogarts u weer toestemming geeft.

Dit gaat altijd in overleg en is per patiënt en soort operatie weer verschillend.

*Zolang er een gasbel in het oog zit, mag u niet vliegen en niet de bergen in.

De inhoud van deze folder is ontleend aan de NOG site.

Vragen

Eventuele vragen kunt u stellen aan uw oogarts of aan de verpleegkundige.

Voor telefoon nummers kijkt u bij 'route en contact' op de website.

Website

Voor meer informatie kunt u kijken op www.oogheelkundeumcg.nl